

INFORMAZIONE

La Tomografia Computerizzata (TC) è un esame largamente diffuso che consente di avere delle immagini di sezioni dei vari distretti del corpo umano. L'esame è poco invasivo. Nel caso della TC della testa e del torace non è necessaria alcuna preparazione preliminare mentre nel caso della TC dell'addome è necessaria spesso la somministrazione preliminare di un liquido (mezzo di contrasto) per via orale. Più raramente questo liquido viene introdotto mediante clistere. Raramente è necessario introdurre un catetere nella vescica.

Durante l'esecuzione dell'esame il paziente è sdraiato su un lettino che viene fatto passare all'interno della macchina di tomografia computerizzata.

L'esame, come detto, è poco invasivo ma non è completamente privo di rischi.

Frequentemente, infatti, è necessario l'uso di una particolare sostanza detta **mezzo di contrasto** contenente iodio che viene iniettata per via endovenosa e che serve ad evidenziare meglio i vari organi e le eventuali patologie.

I mezzi di contrasto sono sostanze innocue nella stragrande maggioranza dei casi. Possono però comportare **effetti tossici generali** interferendo con la funzionalità del fegato, dell'apparato cardiovascolare e del rene in presenza di gravi preesistenti alterazioni di tali apparati. Inoltre in alcuni soggetti possono generare effetti secondari indesiderati (reazioni avverse) di tipo **"pseudoallergico"**; effetti che sfortunatamente sono del tutto imprevedibili.

L'incidenza di queste reazioni avverse con i moderni mezzi di contrasto detti "non ionici" è complessivamente dell'1%. Gli effetti secondari indesiderati da mezzo di contrasto sono classificati in lievi, moderati e gravi.

Le reazioni lievi sono le più frequenti, sono fugaci e non richiedono alcun trattamento; possono consistere in sapore metallico, senso di calore, aumentata salivazione, arrossamento del viso, nausea, vomito, orticaria, palpitazioni, tosse, raucedine.

Quelle moderate (0.5% dei casi) si manifestano come difficoltà respiratoria, pallore, sudorazione profusa, edema al volto, senso di svenimento, con associata diminuzione della pressione arteriosa e regrediscono dopo somministrazione di opportuni medicinali.

Le reazioni gravi (shock, edema della laringe, edema polmonare, crisi convulsive, arresto cardio-respiratorio) sono estremamente rare, possono determinare pericolo di vita e richiedono un trattamento intensivo da parte dell'anestesista/rianimatore che è sempre presente durante l'esecuzione dell'esame.

Eccezionalmente (1/200.000-1/250.000 esami) sono descritte reazioni mortali.

Pertanto per sottoporsi all'esame radiologico il Paziente, considerato il rischio che i mezzi di contrasto possono eventualmente comportare, deve autorizzarne l'uso sottoscrivendo il consenso.

E' necessario specificare prima di essere sottoposto a mezzo di contrasto:

- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| se è in terapia per diabete | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si in terapia con..... |
| se è in terapia per asma | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si in terapia con..... |
| se soffre di allergie | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si specificare |
| se ha avuto reazioni al mezzo di contrasto iodato | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> si specificare |

CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE
candidate all'iniezione intravascolare di sostanze organo - iodate.

Il sottoscrittonato a..... il....., residente a via, tel.....

-Dichiara di essere stato/a adeguatamente informato/a dal medico radiologo sull'indagine TC che deve effettuare, in particolare circa le modalità di esecuzione, l'utilità, tutte le possibili reazioni avverse e i possibili rischi derivanti dall'iniezione di sostanze iodate usate come mezzo di contrasto in radiodiagnostica .

-Dichiara di aver pienamente compreso le modalità di esecuzione, l'utilità, tutte le possibili reazioni avverse e i possibili rischi derivanti dall'iniezione di sostanze iodate usate come mezzo di contrasto in radiodiagnostica .

-Acconsente alla iniezione di sostanze organo-iodate usate come mezzo di contrasto, date le indicazioni cliniche dell'esame Tomografia Computerizzata

Firma del paziente: Firma del medico :Data:...../...../...../

N.B. L'esame contrastografico non verrà eseguito in caso di mancata esplicita approvazione e firma di questo documento.